



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA
Área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais
(Edital n. 02/2024 de 19 de setembro de 2024)

NOME: _____ **CPF** _____

01. De acordo com a Constituição Federal (C.F.) de 1988, em relação aos artigos referentes à saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente e unicamente pelo Estado ou, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 - b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e hierarquizada e constituem um sistema único, denominado de Sistema Único de Saúde (SUS).
 - c) A direção centralizada em cada esfera de governo, o atendimento integral e universal com prioridade para serviços assistenciais e a participação da comunidade, são as diretrizes principais do SUS.
 - d) A participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é competência do SUS, mas sim do Ministério do Meio Ambiente.
 - e) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
02. Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, dispostas no artigo 200 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta:
- a) Participar da formulação de políticas de assistência social para reduzir as iniquidades em saúde no país.
 - b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - c) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
 - d) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
 - e) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
03. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais ou privadas, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
 - b) A Vigilância em Saúde do Trabalhador constitui um conjunto de atividades por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores.
 - c) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar.



- d) A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo unicamente ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, excluindo tal dever das empresas privadas e da sociedade em geral.
- e) Os níveis de saúde não estão relacionados à organização social do País, porém possuem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
04. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei Federal nº 8.080 de 1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
- a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
 - b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
 - c) As atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador abrangem participação, no âmbito de competência das empresas privadas em caráter complementar, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - d) A participação da comunidade, assim como o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, constituem alguns dos princípios do SUS.
 - e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
05. Em relação ao controle social definido por meio da Lei Federal nº 8.142/1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:
- a) As conferências, conselhos e plenárias de saúde, são as principais instâncias colegiadas no controle social.
 - b) A Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
 - c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
 - d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo Conselho.
 - e) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.



06. De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, Estados e Distrito Federal, deverão contar com todos os itens listados nas alternativas abaixo, exceto:
- a) Fundo de Saúde
 - b) Conselho de Saúde
 - c) Plano de Saúde
 - d) Relatório de Gestão
 - e) Comissão Intergestores de Saúde
07. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), assinale a alternativa incorreta:
- a) A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade do poder público e em caráter complementar pela iniciativa privada.
 - b) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
 - c) A análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde.
 - d) A PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
 - e) A PNVS deverá contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade.
08. De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), as ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde abrangente, são denominadas de :
- a) Vigilância Epidemiológica
 - b) Vigilância em Saúde
 - c) Análise da Situação de Saúde
 - d) Informações Estratégias em Vigilância a Saúde
 - e) Planejamento Estratégico em Saúde
09. Conforme preconizado na Política Nacional de Atenção Básica, todas as alternativas abaixo constituem diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, a serem preconizados na Atenção Básica, exceto:
- a) Territorialização
 - b) Equidade
 - c) Resolutividade
 - d) participação da comunidade
 - e) regionalização



10. O conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos, na Política Nacional de Atenção Básica, é denominado de:
- a) Integralidade
 - b) Territorialização
 - c) Equidade
 - d) Adstrição
 - e) Resolutividade
11. Em relação as cirurgias do trato urinário, marque “V” para as alternativas verdadeiras e “F” para as alternativas falsas:
- () A uretostomia pré-púbica pode ser realizada quando as lesões uretrais distais estão presentes. A uretostomia pré-púbica é um procedimento de salvamento realizado quando o dano à uretra membranosa ou peniana é irreparável.
- () No desvio urinário permanente, depois da cistectomia, os ureteres podem ser anastomosados para um conduto intestinal isolado ou reservatório, ou para o cólon intacto, jejuno ou íleo. O desvio urinário permanente não pode ser indicado quando a neoplasia envolve o trígono vesical.
- () A maioria dos urólitos caninos é encontrada na bexiga ou na uretra. Cálculos de estruvita e de oxalato de cálcio são os urólitos mais comuns em cães.
- () Após a remoção do cálculo ureteral em caninos, é indicado a utilização do cateter duplo J para evitar estenose pós-operatória.
- () O BYPASS ureteral subcutâneo não é indicado para felinos que possuem obstrução ureteral por cálculos.
- a) VFVVF
 - b) VVFFV
 - c) VVVVF
 - d) FVVVV
 - e) VVVVF
12. A persistência do ducto arterioso (PDA) é o defeito cardíaco congênito mais comum em cães, ocorrendo infrequentemente em gatos. Com relação a PDA, qual alternativa é incorreta?
- a) Na PDA clássica com desvio da esquerda para a direita ocorre o desvio de sangue da artéria aorta para a artéria pulmonar.
 - b) No PDA reverso com desvio da direita para a esquerda ocorre o desvio de sangue da artéria pulmonar para a artéria aorta.



- c) O achado mais proeminente no PDA com desvio da esquerda para a direita é um sopro contínuo característico (ruído de maquinaria), audível sobre a base esquerda do coração ou na região axilar esquerda.
- d) No PDA com desvio da esquerda para a direita deve-se obrigatoriamente realizar a dupla ligadura e secção do ducto arterioso.
- e) A cianose diferencial (mucosa oral normocorada e mucosa vaginal ou prepucial cianótica) poderá apresentar-se tipicamente presente no PDA reverso (shunt da direita para a esquerda). A cianose ocorre devido a existência de uma mistura de sangue não oxigenado (proveniente da artéria pulmonar) com o sangue oxigenado da aorta.
13. O esôfago transporta alimento, água e saliva da faringe ao estômago. Embora menos comum do que a obstrução intestinal, pode ocorrer obstrução esofágica em cães e gatos relacionada a corpos estranhos. Com relação a obstrução esofágica e os princípios da cirurgia esofágica, analise as frases a seguir:
- As camadas da parede do esôfago incluem mucosa, submucosa, muscular e serosa;
 - A serosa é a camada de sustentação do esôfago e deve ser incorporada em todas as suturas;
 - O padrão de sutura de swift é indicado para a sutura do esôfago;
 - Os corpos estranhos são mais comumente encontrados na entrada torácica, na base do coração, ou na área epifrênica (membrana) porque as estruturas extraesofágicas limitam dilatações nesses locais.
- Está correto o que se afirma em:
- I, II e III, apenas
 - II, III e IV, apenas
 - I, II, IV, apenas
 - III e IV, apenas
 - Todas as alternativas
14. Qual fio de sutura é mais resistente à TENSÃO:
- Categute cromado
 - Polipropileno
 - Náilon
 - Polietileno de alto peso molecular
 - Polidioxanona
15. Qual destas malformações anatômicas não ocorrem em cães Toys com luxação patelar medial de grau IV?
- Valgo tibial
 - Rasamento do sulco troclear
 - Torção tibial distal externa
 - Varo femoral
 - Valgo femoral



16. A hérnia perineal resulta do enfraquecimento e separação dos músculos e fáscias que formam o diafragma pélvico, promovendo deslocamento caudal de órgãos abdominais ou pélvicos para o períneo. Sobre a hérnia perineal é incorreto afirmar:
- A doença é mais comum em cães machos, especialmente os não castrados.
 - A idade de maior incidência está entre sete e nove anos de idade em cães.
 - Os sinais clínicos mais citados são tenesmo, constipação e aumento de volume perineal, que pode ser redutível ou não.
 - Quando a hérnia é bilateral, as lesões podem ser corrigidas conjuntamente ou com intervalo de quatro a seis semanas entre os procedimentos cirúrgicos.
 - O nervo obturador deve ser preservado para evitar disfunção no esfíncter anal externo.
17. A cirurgia de sinfisiodesse púbica juvenil deve ser realizada antes dos:
- 5 meses
 - 6 meses
 - 9 meses
 - 12 meses
 - 18 meses
18. No tratamento de uma fratura cominutiva diafisária de tíbia em cães adultos é considerado método errado de estabilização dos fragmentos:
- Colocação de Placa ortopédica fixada com 3 parafusos em cada fragmento.
 - Fixação esquelética externa com 3 pinos (com rosca central positiva no meio) em cada fragmento, estabilizados externamente com barras de cimento de polimetilmetacrilato.
 - Plate – Rod (placa fixada com parafusos e pino intramedular).
 - Haste bloqueada.
 - Pino intramedular introduzido pela epífise tibial proximal, passando pelo canal medular dos dois fragmentos.
19. Indique a resposta certa: Em um cão adulto com luxação coxofemoral craniodorsal o membro afetado ficaria:
- Mais curto em direção ao chão, aduzido e com rotação externa do joelho.
 - Mais curto em direção ao chão, abduzido e com rotação interna do joelho.
 - Menor apoio de peso e com suas articulações metatarso falangeanas mais flexionadas cranialmente.
 - Mais comprido em direção ao chão, abduzido e com rotação interna do joelho.
 - Mais comprido em direção ao chão, abduzido e com rotação externa do joelho.
20. Indique a resposta errada: Em um cão de dois anos de idade de médio porte (30 kg) com ruptura do ligamento cruzado cranial, para esse diagnóstico, seria errado verificar:
- Teste de gaveta cranial.
 - Sinal de Ortolani.
 - Teste de compressão tibial.
 - Sentar com o membro exteriorizado.
 - Teste de Hiperflexão do joelho.



21. Indique a resposta errada: Na displasia do cotovelo canina a malformação ou lesão existente pode ser:
- a) Rádio mais curto que a ulna com incongruência articular.
 - b) Fragmentação do processo coronóide medial.
 - c) Degeneração articular em superfície ulnar proximal.
 - d) União prematura do processo ancôneo.
 - e) Osteocondrose do côndilo umeral medial.
22. Assinale a resposta errada. Em relação ao conceito de osteossíntese biológica, os seguintes componentes devem ser preferencialmente seguidos:
- a) Manutenção entre os fragmentos: do coágulo, fatores de crescimento e mediadores de inflamação.
 - b) Redução fechada e indireta.
 - c) Reconstituição anatômica da anatomia do osso.
 - d) Manutenção da irrigação e inserções musculares nos fragmentos da fratura.
 - e) Preservação do periósteo
23. Assinale a resposta certa. Qual das seguintes fraturas de rádio terá potencial de sofrer em maior magnitude o fenômeno complicador da consolidação óssea denominado de “STRAIN” (alteração relativa do comprimento do espaço, fenda, entre os fragmentos da fratura).
- a) Transversa
 - b) Incompleta
 - c) Espiralada
 - d) Segmentar
 - e) Cominutiva
24. A terminologia Cirúrgica é o nome técnico dado a uma cirurgia. O termo técnico cirúrgico define ou descreve o procedimento cirúrgico realizado, determinando assim o local e a técnica cirúrgica utilizada no paciente cirúrgico, e este se constitui de partes como os prefixos e sufixos para a construção do mesmo. Diante do exposto, assinale abaixo a alternativa CORRETA quanto aos termos técnicos cirúrgicos:
- a) Adrenalectomia consiste na excisão cirúrgica da glândula adanal.
 - b) Coledocostomia consiste na criação de um ducto no parênquima hepático.
 - c) Esplenectomia consiste na remoção cirúrgica parcial do parênquima ileal.
 - d) Prostatectomia radical consiste na excisão cirúrgica da próstata.
 - e) Craniotomia ou craniectomia consiste na retirada de um retalho ósseo do crânio para acessar o cérebro do paciente.



25. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- a) Não é objetivo da síntese cirúrgica a manutenção da contiguidade dos tecidos, uma vez que, isto não facilita as fases iniciais do processo de cicatrização, nem determina que a continuidade tecidual possa ser restabelecida.
- b) A diérese cirúrgica representa o momento em que se efetuam aberturas de tecidos do corpo dos paciente por planos teciduais; e podem ser executadas por bisturi, serra, tesoura, rugina, cisalha, costótomo, bisturi elétrico, osteótomo e/ou goiva, entre outros.
- c) A hemostasia cirúrgica deve ser executada de modo a não impedir, deter ou prevenir o sangramento tecidual do paciente.
- d) A exérese cirúrgica é realizada no momento da dermorrafia do tecido cutâneo do paciente, momento no qual se realiza a extirpação de parte ou todo um órgão, sem finalidade terapêutica.
- e) Na síntese cirúrgica não são empregados materiais como agulhas, fios, porta-agulhas, pinças e nem grampos cirúrgicos.

26. Os instrumentais cirúrgicos de uso geral são classificados de acordo com a função que executam durante os procedimentos realizados para a execução dos princípios da técnica cirúrgica, nos respectivos tempos cirúrgicos de diérese, hemostasia, exérese e síntese cirúrgicas. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa ERRADA:

- a) São instrumentais de diérese os bisturis manuais, elétricos, ultrassônicos e de argônio; tesouras e serras manuais, elétricas e pneumáticas.
- b) São instrumentais de preensão as pinças de Allis, Mixter, Kelly e Crile.
- c) São instrumentais de exposição os afastadores de Farabeuf, Gosset, Balfour e Finochietto.
- d) São instrumentais de síntese cirúrgica os porta agulhas de Mayo-Hegar, Olsen-Hegar, Mathieu e grampeadores e grampos cirúrgicos.
- e) São instrumentais de campo cirúrgico a pinça de Backhaus e Jones.

27. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa ERRADA:

- a) Degermação - Significa a diminuição do número de microrganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele com água e sabão. Sabões e detergentes sintéticos removem mecanicamente a maior parte da flora microbiana existente nas camadas superficiais da pele, mas não conseguem remover aquela que coloniza as camadas mais profundas.
- b) Desinfecção - É o processo pelo qual se destroem os germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvimento na pele dos humanos e animais pacientes cirúrgicos.
- c) Esterilização - Processo de destruição de todas as formas de vida microbiana mediante a aplicação de agentes físicos e/ou químicos.
- d) Assepsia - Procedimento executado para impedir a penetração de microrganismos num ambiente que não os tem; manter o ambiente livre de germes patógenos; sendo possível apenas em objetos inanimados, haja vista, que na pele humana ou animal é impossível a desinfecção completa, destruindo 100% dos mesmos.
- e) O cloro é considerado o antisséptico mais potente dos germicidas, motivo pelo qual é correto a sua aplicação da antisepsia do sítio cirúrgico de humanos e animais.



28. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- a) Paramentação inicial com a devida colocação do pijama cirúrgico, gorro, máscara e óculos de proteção e sapato próprio para ambiente cirúrgico; e a paramentação estéril, que consiste na vestimenta do avental ou capote cirúrgico.
- b) Paramentação inicial com a devida colocação do pijama cirúrgico, máscara e óculos de proteção e sapato próprio para ambiente cirúrgico; e a paramentação estéril, que consiste na vestimenta do avental ou capote cirúrgico.
- c) Paramentação inicial com a devida colocação do gorro, máscara e óculos de proteção para ambiente cirúrgico; e a paramentação estéril, que consiste na vestimenta do avental ou capote cirúrgico e sapato próprio para ambiente cirúrgico.
- d) Paramentação inicial com a devida colocação da máscara, óculos de proteção e sapato próprio para ambiente cirúrgico; e a paramentação estéril, que consiste na vestimenta do avental ou capote cirúrgico e calçamento das luvas estéreis.
- e) Paramentação inicial com a devida colocação do pijama cirúrgico, gorro, máscara e óculos de proteção e sapato próprio para ambiente cirúrgico; e a paramentação estéril consiste na vestimenta do avental ou capote cirúrgico e o calçamento das luvas cirúrgicas estéreis.

29. Analise as afirmativas abaixo:

- I- Os fios são classificados como absorvíveis naturais (náilon), inabsorvíveis biodegradáveis (aço inox) e inabsorvíveis não biodegradáveis (Categute simples), respectivamente.
 - II- Os fios cirúrgicos não biodegradáveis são o orgânico (categute cromado) e sintético (algodão), respectivamente.
 - II- O fio de seda é classificado como inabsorvível biodegradável, sendo considerado pela OMS como o fio ideal para uso universal nos tecidos orgânicos.
 - IV- Os fios de polipropileno e de algodão são classificados como fios cirúrgicos absorvíveis sintéticos.
 - V- Os fios de sutura classificados como inabsorvíveis biodegradáveis são o aço inoxidável e a poliglactina 910.
- Responda:

- a) I, II e V estão corretas.
- b) Apenas I está errada.
- c) Todas as afirmativas estão corretas.
- d) I e V estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão erradas.



30. As normas para a realização de uma boa sutura, requerem:

Assepsia e antissepsia adequada/ Suturas de tecidos de mesma natureza em planos (ex.: suturar aponeurose com aponeurose, epiderme com epiderme.)/ Bordas alinhadas/ Se a ferida for irregular, adequar as bordas/ Hemostasia adequada (não utilizar excessivamente o bisturi elétrico e não apertar a sutura a ponto de isquemiarem os tecidos)/ Abolição dos espaços mortos/ Limpar a ferida (retirando sujidade e corpos estranhos)/ Fio adequado ao tecido a ser suturado/ e Técnica de sutura adequada. Diante do exposto assinale a afirmativa que está ERRADA:

- a) O Ponto em U vertical ou Donatti - É altamente hemostático e pouco estético (bordas evaginantes). Possui as mesmas indicações do ponto em X ou Sultan, além de ser usado em áreas de muita tensão (ex.: cotovelo); sendo conhecido como longe, longe, perto, perto, em razão da técnica para realizá-lo.
- b) O Ponto Festonado ou de Reverdin - É considerado um ponto simples contínuo modificado, devido ao alçamento de cada passagem de movimento da agulha pela pele; motivo pelo qual não pode ser usado em feridas que apresentem tensão excessiva na área da ferida, a exemplo das feridas com perdas teciduais mínimas.
- c) O Ponto Simples Isolado - É um ponto universal e possui ações na hemostasia e estética moderada.
- d) O Ponto de Sultan - É altamente hemostático, porém pouco estético. Executado para que fiquem duas alças cruzadas. É usado em cavidades, fechamento de paredes e suturas de aponeurose, músculos, e até em couro cabeludo.
- e) O ponto Intradérmico contínuo - É feito na derme do paciente e gera o melhor resultado estético. Possui hemostasia e tração baixas. Sempre utilizado em feridas limpas e com bordas alinhadas.

31. O acesso cirúrgico à cavidade torácica é realizado através de toracotomias. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

- a) A litotomia é técnica cirúrgica de eleição para a abertura da cavidade torácica com finalidade terapêutica.
- b) São consideradas indicações para a realização de toracotomias: Pneumotórax/ Empiema/ Trauma/ Cirurgias cardíaca, aórtica, pulmonar ou de esôfago/ Biópsia e Massagem cardíaca interna.
- c) A incisão Torácica Anterior na lateral Esquerda do tórax não está indicada para acesso ao pulmão, pericárdio e aorta.
- d) A esternotomia não é uma técnica cirúrgica para acesso à cavidade torácica.
- e) A esternectomia é a técnica cirúrgica de eleição para o acesso à cavidade torácica em cães, sendo contra-indicada todas as demais técnicas.

32. Analise as afirmativas abaixo:

I - A laparotomia é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal.

II- A laparotomia pode ter indicação eletiva ou exploratória diagnóstica

III- As Laparotomias podem ser realizadas nos sentidos longitudinais, transversais, oblíquas ou combinadas.

IV- A laparotomia Transversal obedece a abertura na mesma direção das linhas de tensão dos tecidos.

V- A Laparotomia Oblíqua é uma técnica que sacrifica os músculos e nervos e não respeitam a anatomia e fisiologia tecidual, logo não é utilizada.

Responda:

- a) I, II e V estão corretas.
- b) II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas a V está correta.
- d) I, II, III, IV e V estão corretas.
- e) Apenas a V está incorreta.



33. São constituintes na avaliação das agulhas de síntese cirúrgica:
- I- O corpo das agulhas pode ser cilíndrico, cortante ou plano.
 - II- A ponta das agulhas cirúrgicas pode ser romba, cortante e plana.
 - III- As agulhas para uso em tecidos densos como a pele deve ter ponta triangular e corpo cortante.
 - IV- As agulhas para uso em estruturas delicadas como parede de uma artéria, deve ter a ponta cilíndrica e corpo rombo.
 - V- As agulhas para uso em tecido da córnea ocular deve ter a ponta e o corpo rombo, para promover hemostasia no ato da síntese cirúrgica.

Responda:

- a) I e II estão erradas.
 - b) III e IV estão erradas.
 - c) I e V estão corretas.
 - d) Apenas a V está errada.
 - e) Todas estão corretas.
34. A cirurgia reconstrutiva é uma especialidade que vem ganhando destaque nos últimos anos, se tornando uma excelente opção para pacientes que tem grandes perdas cutâneas em decorrência de traumas e doenças, como no caso das neoplasias. Entre as modalidades terapêuticas da cirurgia reconstrutiva, é citado o uso de retalhos de padrão axial, que incorporam uma artéria e veia cutânea direta, aumentando a sua vascularização, quando comparado ao retalho de padrão subdérmico. Entre as opções de retalhos de padrão axial citados abaixo, qual deve ser preferencialmente empregado, pela sua localização, para cobrir lesões amplas na região da face interna da coxa?
- a) Artéria epigástrica superficial cranial
 - b) Artéria subdérmica caudal
 - c) Artéria epigástrica superficial caudal
 - d) Artéria toracodorsal
 - e) Artéria temporal superficial
35. Um paciente da espécie canina, fêmea, com três anos foi encaminhada para atendimento veterinário apresentando quadro de abdômen agudo, inapetência, vômito e perda de peso. Os tutores relataram que a mesma não tem acesso à rua, não tem outros animais contactantes, está vacinada e vermifugada, e foi castrada após o primeiro cio. Na avaliação clínica, foi percebido dor abdominal à palpação, icterícia, taquipnéia e prostração. Na sequência, a paciente foi encaminhada para realização de exame ultrassonográfico do abdômen total, onde foi visibilizado a distensão da vesícula biliar e dilatação do ducto biliar comum e ductos hepáticos, indicando a obstrução completa do ducto biliar comum. Diante dos sinais clínicos e achados do exame ultrassonográfico, foi recomendado o encaminhamento da paciente para cirurgia. Qual procedimento deve ser realizado na paciente em questão?
- a) Colectistectomia
 - b) Lobectomia hepática
 - c) Colelitíase
 - d) Colectistotomia
 - e) Colectistoduodenostomia



36. O prolapso da glândula da terceira pálpebra é uma condição ainda não completamente definida em que a glândula se encontra hipertrofiada e prolapsada, se estendendo para além da borda da membrana nictante, ocorrendo com mais frequência em cães da raça Buldogue, Shih Tzu e Lha Apso. Os pacientes acometidos normalmente apresentam conjuntivite e secreção ocular, podendo a condição ser uni ou bilateral. Com relação ao tratamento definitivo recomendado, marque a alternativa correta:

- a) Uso de colírios lubrificantes e anti-inflamatórios
- b) Reposição da glândula
- c) Procedimento de Holt-Celsus
- d) Exenteração
- e) Remoção da glândula

37. A síndrome das vias respiratórias do braquicefálico é uma afecção que vem se tornando cada vez mais comum na clínica cirúrgica de pequenos animais, em decorrência da maior procura dos tutores por cães de raças braquicefálicas, como Buldogue Francês, Pequês, Pug e Shih Tzu. A doença causa uma obstrução das vias áreas superiores, dificultando a passagem do ar e resultando nos sinais clínicos mais evidentes, como intolerância ao exercício, ronco e dispneia, ficando os mesmos mais evidentes em situações de estresse e calor. Em pacientes portadores da síndrome, cite três alterações anatômicas que geralmente estão presentes:

- a) Estenose de narina, prolongamento de palato mole e hipoplasia traqueal
- b) Estenose de narina, prolongamento de palato mole e inversão de tonsila
- c) Estenose de narina, encurtamento de palato mole e hipoplasia traqueal
- d) Estenose de narina, encurtamento de palato mole e colapso traqueal
- e) Macroglossia, encurtamento de palato mole e eversão dos sáculos laríngeos

38. A síndrome da dilatação vólculo gástrica é uma doença multifatorial, observada com maior incidência em cães de grande porte, como Pastor Alemão e Doberman, pelo fato de muitos serem utilizados como animais de guarda e cujo manejo, é realizado de maneira equivocada, como alimentar uma vez ao dia em grande volume, causando sobrecarga do estômago. Como sinais clínicos mais comuns são observados o abdômen distendido e timpânico, dor abdominal, pulso periférico fraco, taquicardia, dispneia e mucosas pálidas, sendo os últimos mais observados quando o quadro evolui para o choque. O tratamento deve ser rápido, entretanto é necessário estabilizar o paciente antes do procedimento cirúrgico, visando minimizar o risco de complicações e óbito durante ou após a cirurgia. Os cuidados pré-operatórios mais recomendados são:

- i. Massagens na parede abdominal
- ii. Administração de antibiótico
- iii. Gastropexia
- iv. Administração de antioxidante
- v. Descompressão gástrica
- vi. Radiografia abdominal em projeção ventrodorsal

Das alternativas descritas acima, marque quais devem ser instituídas:

- a) i, ii e v
- b) i, ii e iii
- c) ii, iii e vi
- d) ii, iv e v
- e) iii, iv e vi



39. A cirurgia de castração eletiva é muito recomendada nas espécies caninas e felinas por ser um procedimento que tem efeito preventivo para doenças que podem acometer os pacientes não castrados com idade mais avançada, como a hiperplasia de próstata e tumores testiculares nos machos, e tumores de mama e piometra nas fêmeas. Com relação à cirurgia de ovariectomia (OH), algumas complicações podem ocorrer, porém raramente alguns pacientes desenvolvem piometra de coto após a cirurgia, fazendo-se necessário uma nova abordagem cirúrgica para:

- a) Remover o coto uterino remanescente
- b) Remover o coto uterino e ovário remanescente
- c) Remover o ovário remanescente
- d) Debridar o coto uterino
- e) Drenar o coto uterino remanescente

40. Em relação a cavidade oral e orofaringe, marque o “V” para a alternativa verdadeira e “F” para a alternativa falsa e em seguida assinale a alternativa correta.

() Tumores orais ocorrem 2,6 vezes mais em cães do que em gatos. Os tumores orais benignos são raros nos gatos e as neoplasias orais benignas mais comuns em cães são as epúlides.

() A mucocèle sublingual (rânula) é uma coleção de saliva no tecido sublingual caudal para as aberturas dos ductos sublinguais e mandibulares. A marsupialização de uma rânula é indicada como tratamento cirúrgico.

() A mucocèle cervical é a coleção de saliva ventral ao globo ocular.

() A mucocèle zigomática é uma coleção de saliva nas estruturas mais profundas do espaço intermandibular, do ângulo da mandíbula ou da região cervical superior. A excisão das glândulas salivares mandibulares e sublinguais são necessárias para mucocèles zigomáticas.

- a) VVVV
- b) VVFF
- c) VVVF
- d) FFFV
- e) FFVV