



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE




PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA
Área de Diagnóstico por Imagem
(Edital n. 02/2024 de 19 de setembro de 2024)

NOME: _____ CPF _____

- 1- Observe essa imagem tomográfica em corte transversal do abdômen de um cão normal após administração de contraste iodado intravenoso. Assinale a letra que corresponde à correta identificação numérica de cada órgão.



- a) 1- Baço, 2- Rim esquerdo, 3- Ureter esquerdo, 4- Cólon, 5- Intestino delgado
 - b) 1- Lobo hepático, 2- Rim direito, 3- Ureter direito 4- Cólon, 5- Intestino delgado
 - c) 1- Lobo hepático, 2- Rim esquerdo, 3- Ureter esquerdo, 4- Intestino delgado, 5- Estômago
 - d) 1- Baço, 2- Rim direito, 3- Ureter direito, 4- Intestino delgado, 5- Cólon
 - e) 1- Baço, 2- Rim esquerdo, 3- Ureter esquerdo, 4- Intestino delgado, 5- Estômago
- 2- Imagens de exame tomográfico de um felino de 1 ano de idade, fêmea, SRD, com histórico de dispneia e emaciação. Paciente positivo para FIV e FELV e negativo para pesquisa de hematozoários. Qual a principal suspeita diagnóstica com base nos achados clínicos e imagens tomográficas.



- a) Efusão pleural gravitacional
- b) Timoma
- c) Linfoma mediastinal
- d) Metástase pulmonar
- e) Granuloma fúngico

3- Procedimentos de coleta guiada são ferramentas que auxiliam no diagnóstico de diversas enfermidades em pequenos animais. Com relação ao procedimento de colecistocentese assinala a alternativa incorreta.




- a) Mucocele biliar grau IV é uma contraindicação do procedimento
- b) As técnicas descritas são as transhepática e transperitoneal
- c) Peritonite biliar é um risco após procedimento.
- d) Colecistite enfisematosa e colangite linfocítica são indicações para procedimento
- e) Análise parasitológica da bile coletada pode ser realizada

4- A modalidade de tomografia computadorizada realiza imagens utilizando a radiação ionizante, como nas radiografias. A tomografia computadorizada apresenta vantagens das estruturas quando comparada às radiografias simples. Constitui a principal vantagem da tomografia computadorizada, em relação às radiografias simples:

- a) Realização de reconstruções tridimensionais.
- b) Possibilidade de identificação de estruturas sem sobreposição de imagens.
- c) Menor quantidade de radiação nos exames tomográficos
- d) Necessidade de anestesia para adquirir as imagens na maioria dos casos
- e) Permite avaliar o tórax e abdômen todas as espécies de animais domésticos.


- 5- Nos casos de pancreatite aguda em um cão, assinale a alternativa correta que melhor caracteriza ultrassonograficamente esse quadro.



- a) Dimensões normais, ecotextura heterogênea, gordura normal ao redor.
 - b) Dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, gordura normal ao redor.
 - c) Dimensões normais, ecotextura hiperecogênica, gordura homogênea ao redor.
 - d) Dimensões reduzidas, ecotextura hipoeecogênica, gordura homogênea ao redor.
 - e) Dimensões aumentadas, ecotextura heterogênea, aspecto hipoeecogênico e hiperecogenicidade da gordura ao redor.
- 6- Um cão macho de 12 anos, não castrado, foi encaminhado para o nosso setor para exame ultrassonográfico. O histórico clínico revelou tenesmo fecal, disúria e estrangúria com evolução de 3 semanas. Os achados ultrassonográficos demonstraram presença de estrutura arredondada, de paredes finas, sem sinais de Doppler, com conteúdo anecóico, que se iniciava adjacente a próstata e direcionava-se cranialmente até a região mesogástrica. A bexiga estava deslocada cranialmente. Qual a suspeita diagnóstica de maior probabilidade.
- a) Neoplasia prostática
 - b) Hiperplasia prostática cística
 - c) Prostatite crônica e cistos prostático
 - d) Cisto paraprostático
 - e) Prostatite aguda



- 7- Baseados na interpretação da ultrassonografia do sistema urinário, associe as colunas e assinale a alternativa abaixo que melhor se adequa a essa associação.
- a. Cálculo renal; b) Infarto renal; c) Cisto renal; d) Abscesso renal; e) “sinal da Medular”
- () Área triangular focal ou multifocal em região cortical.
- () Halo ecogênico/hiperecótico em medular adjacente a junção corticomedular.
- () Estrutura complexa focal, ecogenicidade mista e contorno pouco delimitado.
- () Estrutura hiperecótica localizada na pelve produtora de sombreamento acústico posterior.
- () Estrutura anecóica, focal ou multifocal, produtora de reforço posterior.
- a) B, E, D, A, C
b) C, E, D, A, B
c) B, C, A, B, E
d) C, A, B, D, E
e) B, C, A, E, D
- 8- O exame ecocardiográfico é uma ferramenta essencial para diagnóstico e acompanhamento de cães cardiopatas. Neste vídeo/imagem é possível identificar alterações estruturais importantes. Assinale qual achado não é observado neste vídeo/imagem.



- a) Dilatação atrial esquerda
b) Dilatação do tronco pulmonar
c) Dilatação do ventrículo esquerdo
d) Degeneração da valva mitral
e) Efusão pericárdica

9- Com relação a esta enfermidade assinala a resposta errada.




- a) Dilatação do tronco pulmonar pode ser identificada quando comparado com a dimensão da aorta.
- b) Ventrículo e átrio direito tendem a apresentar remodelamento.
- c) Exames radiográficos de tórax podem revelar pneumonite e alterações nodulares.
- d) O ecocardiograma é o exame padrão ouro para diagnóstico definitivo nos diferentes estágios da doença.
- e) A maioria dos pacientes apresenta ritmo sinusal ao exame eletrocardiográfico.

10- Com relação aos princípios de exames tomográficos, marque a alternativa incorreta.

- a) Quanto maior o “field o view” (FOV) melhor a definição das imagens.
- b) Topograma ou imagem em “scout” é realizada anteriormente ao exame tomográfico para melhor selecionar a área a ser investigada.
- c) Unidades tomográficas ou unidades Hounsfield, indicam a escala de atenuação da radiação X nos meios biológicos.
- d) Nos equipamentos de tomografia quanto maior o número de canais maior será rapidez na aquisição das imagens.
- e) Os equipamentos de tomografia computadorizada emitem radiação X para proporcionar a aquisição das imagens.

11-Sobre a imagem/vídeo apresentado, marque a alternativa correta:



- a) Nota-se o ceco de um felino, com visível espessamento de parede, sendo tiflíte um dos principais diagnósticos diferenciais.
- b) Observa-se aumento de ecogenicidade mesentérica adjacente a área de neoformação intestinal, com linfadenomegalia associada.
- c) A imagem demonstra linfadenomegalia cística cecal, com aumento de ecogenicidade mesentérica adjacente.
- d) A imagem demonstra lesão focal em cólon transverso, com perda de estratificação parietal e de localização intramural.
- e) Observa-se forte sombreamento acústico distal em conteúdo intestinal, com discreta dilatação cranial, sendo corpo estranho um dos diagnósticos diferenciais neste caso.

12- Sobre o exame eletrocardiográfico marque a alternativa incorreta:

- a) A onda P se forma a partir da repolarização do átrio direito, e se completa com a repolarização do átrio esquerdo. Desta forma, a onda P representa a repolarização dos átrios.
- b) O complexo QRS é formado pela onda Q que é a despolarização dos septos, a onda R que é a despolarização do ápice e a onda S que é a despolarização das paredes livre. Desta forma, o complexo QRS representa a despolarização ventricular.
- c) A onda T é a repolarização dos ventrículos, saída de potássio do músculo ventricular.
- d) Onda *P pulmonale* pode sugerir aumento atrial direito.
- e) Onda *P mitrale* pode sugerir aumento atrial esquerdo.

- 13- O eletrocardiograma é com grande frequência solicitado ao setor de imagem como exame complementar para pacientes que serão submetidos a procedimentos anestésicos ou quando se suspeita de cardiopatias. Considerando parte deste traçado (D2) de um paciente canino, marque a alternativa correta:




- a) Existe infradesnívelamento do segmento ST.
 - b) O traçado possui episódio de complexo ventricular prematuro.
 - c) Observa-se sinais de onda P pulmonale.
 - d) O traçado sugere sobrecarga biatrial.
 - e) O traçado sugere taquicardia ventricular.
- 14- Um felino filhote, fêmea, de 6 meses, foi atendido no Hospital Veterinário da UFRPE com queixas de hiporexia, vômitos esporádicos, diarreia, e emagrecimentos progressivo. Após atendimento clínico, foi encaminhado para o setor de diagnóstico por imagem para realização de exame ultrassonográfico. Sobre o vídeo, marque a alternativa correta:



- a) Na ultrassonografia observa-se pregueamento de alças intestinais de intestino delgado, com perda de estratificação parietal focal.
- b) Observa-se presença de corpo estranho linear em lúmen intestinal, levando a pregueamento de alça adjacente.
- c) Observa-se presença de estrutura filiforme, com paredes ecogênicas e interior hipoeecóico, compatível com parasito em lúmen intestinal.
- d) Espessamento de camada muscular intestinal, sendo linfoma um dos principais diagnóstico diferenciais neste caso.
- e) Sinais de obstrução parcial em região de duodeno.

15- Marque a alternativa correta de acordo com a imagem/vídeo apresentado:



- a) A posição do transdutor usada para obter esta imagem é a paraesternal esquerda.
- b) Nesta imagem podemos mensurar a circunferência da aorta e da artéria pulmonar, cujo valor da normalidade de sua relação para cães é de até 1.6.
- c) O número 1 se refere ao ventrículo direito, 2 ao átrio esquerdo, 3 a aorta e 4 ao átrio direito.
- d) O número 1 se refere ao ventrículo esquerdo, 2 ao átrio esquerdo, 3 a aorta e 4 a artéria/tronco pulmonar.
- e) O número 1 se refere ao ventrículo esquerdo, 2 ao átrio esquerdo, 3 ao ventrículo direito e 4 ao átrio direito.



16 - Um cão, com histórico de atropelamento e ausência de micção, foi encaminhado para estudo radiográfico. Nas imagens obtidas observou-se presença de contraste no espaço retroperitoneal. Dessa observação pode-se afirmar:

- a- Ocorreu ruptura do ligamento retroperitoneal.
- b- A visibilização de contraste nesse espaço é esperada, após um trauma.
- c- Ocorreu ruptura de ureter.
- d- A técnica contrastada realizada foi de caráter compressivo.
- e- Todas respostas estão incorretas.

17- Existem sinais radiográficos que possibilitam a identificação de morte fetal. Diante dessa informação podemos considerar correto afirmar:

- a- A visibilização do esqueleto fetal é um sinal de feto mumificado.
- b- A visibilização de desorganização esquelética é sinal de maceração fetal.
- c- A visibilização de diminuição de radiopacidade do esqueleto fetal é sinal de mumificação.
- d- As opções "a", "b" e "c" estão corretas.
- e- As opções "b" e "c" estão corretas.

18- Observou-se nas radiografias de um paciente: elevação dorsal do ápice cardíaco, colabamento de lobo pulmonar e aparente deformação da silhueta cardíaca, pode-se dizer que:

- a- As imagens foram obtidas com o paciente em estação e que o mesmo apresentava enfisema pulmonar.
- b- As imagens foram obtidas com o paciente em decúbito dorsal e o paciente apresentava visibilização do timo e ruptura traqueal.
- c- As imagens foram obtidas na projeção látero-lateral e o paciente apresentava pneumotórax.
- d- As imagens foram obtidas em decúbito ventral e o paciente apresentava pneumomediastino e visibilização do timo.
- e- As imagens foram obtidas na projeção ventrodorsal e o paciente apresentava ruptura pleural.



19- Sabendo-se que o paciente encaminhado para realização de exame radiográfico apresentava suspeita clínica de efusão pleural; qual o procedimento adequado na realização do exame?

- a- Manter o paciente em estação e realizar a projeção médio-lateral, após sua sedação.
- b- Posicionar o animal em decúbito dorsal e realizar a projeção dorsoventral.
- c- Após sedação, posicionar o paciente em decúbito lateral e realizar a projeção médio- lateral.
- d- Posicionar o paciente em decúbito lateral ou em estação e realizar a projeção látero- lateral.
- e- Todas estão incorretas.

20- A pneumonia por aspiração pode ocorrer em casos que:

- a- A colecistografia foi realizada com pera de borracha e o paciente apresentou tosse durante a administração do contraste.
- b- Realizou-se contraste duplo e o paciente apresentou reação ao contraste positivo.
- c- O paciente apresentava diminuição da luz esofágica e tosse, e realizou-se contraste a base de sulfato de bário
- d- Realizou-se contraste iodado, através de sonda, e o paciente apresentou reação alérgica ao contraste.
- e- Todas opções estão erradas.

21- Pode-se visibilizar como sinal radiográfico de um paciente portador de espondilomiopatia cervical:

- a- Espondilolistese.
- b- Fratura dos côndilos do occipital.
- c- Sinal de Spalding
- d- Malformação de corpo vertebral
- e- Linhas de Morgan

22- Sedou-se uma onça para avaliação radiográfica dentária; durante a realização do exame observou-se que o animal apresentou alteração respiratória. Diante do quadro, decidiu-se realizar projeções torácicas, onde foi visibilizado o padrão intersticial não estruturado comprometendo os lobos pulmonares diafragmáticos. Diante desse histórico pode-se dizer:

- a- O animal aspirou saliva que se acumulou caudal à base do coração.
- b- A onça apresenta espessa camada de gordura, o que confere esse padrão radiográfico naturalmente por ser posicionada em decúbito lateral.
- c- A paciente apresentou reação ao fármaco usado e desenvolveu edema pulmonar agudo.



d- O animal apresentava fibrose pulmonar congênita silenciosa, sendo os sinais clínicos estimulados pelo estresse durante o exame.

e- Todas estão incorretas.

23- Foi encaminhado para exame radiográfico um filhote de raposa que vivia em cativeiro e parou de se locomover; o laudo clínico era de raquitismo. Foram realizadas projeções látero-lateral, ventrodorsal e médio-lateral do tórax, abdome e membros. Diante desse histórico pode-se considerar que foram observados nas imagens obtidas os sinais radiográficos:

- a- aumento de radiodensidade de tecidos moles e sinal de Raios de sol ou explosão.
- b- Estreitamento de córtex óssea e fraturas patológicas.
- c- Triângulo de Codman e edema de tecidos moles adjacentes.
- d- Alargamento da córtex óssea e neoformações ósseas.
- e- Todas estão corretas.

24- A escoliose, cifose e lordose são alterações da coluna vertebral possíveis de diagnóstico radiográfico considerando-se respectivamente:

- a- Projeção látero-lateral e desvio em "S" da coluna vertebral; projeção ventrodorsal e desvio dorsal da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio ventral da coluna vertebral, respectivamente.
- b- Projeção ventrodorsal e desvio em "S" da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio ventral da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio dorsal da coluna vertebral, respectivamente.
- c- Projeção ventrodorsal e desvio dorsal da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio em "S" da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio ventral da coluna vertebral, respectivamente.
- d- Projeção ventrodorsal e desvio em "S" da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio dorsal da coluna vertebral; projeção látero-lateral e desvio ventral da coluna vertebral, respectivamente.
- e- Todas estão incorretas.



25- Um cão, filhote de 6 meses, foi encaminhado para realização de exame radiográfico com histórico de regurgitação de alimentos sólidos e líquidos logo após ingestão. O procedimento mais adequado para esclarecimento radiográfico do caso seria:

- a- Posicionamento do paciente em decúbito lateral e realização da projeção látero- lateral; em seguida realizar esofagografia.
- b- Posicionamento do paciente em decúbito ventral e realização da projeção látero- lateral; em seguida realizar gastroenterografia.
- c- Posicionamento do paciente em decúbito lateral e realização da projeção ventrodorsal; em seguida realizar colecistografia.
- d- Posicionamento do paciente em decúbito lateral e realização da projeção látero- lateral; em seguida realizar mielografia.
- e- Todas estão incorretas.

26- Um equino, adulto, foi encaminhado para realização de exame radiográfico para reavaliação de rotação da 3a falange, esquerda. Pode-se afirmar que:

- a- Foram realizadas projeções dorso-palmar e palmo-dorsal, com o paciente em decúbito lateral direito, para estudo radiográfico das falanges.
- b- Realizou-se a projeção médio-lateral, com o paciente em decúbito lateral esquerdo, e visibilizaram-se esquirolas intra-articulares.
- c- Realizou-se a projeção látero-medial, com o paciente em estação, e visibilizou-se perda de paralelismo entre a muralha do casco e a 3a falange.
- d- Foi realizada a projeção dorso-palmar, com o paciente em estação, e visibilizou-se osteófito em tendão do músculo extensor comum dos dedos.
- e- Todas estão incorretas.

27- Um “cavalo de vaquejada”, apresentando aumento de volume na articulação radiocárpica e carpometacarpal, foi encaminhado para exame radiográfico por não suportar apoiar a pata no solo. Pode-se dizer que:

- a- Visibilizou-se, na radiografia obtida, deslocamento dorsal do calcâneo, achado corriqueiro em cavalos de vaquejada.
- b- Visibilizou-se, na radiografia obtida, luxação do osso carpo acessório, distensão da cápsula articular e microfraturas intra-articulares.
- c- Visibilizou-se, na radiografia obtida, luxação do tálus e lesão cística subcondral.



d- Visibilizou-se, na radiografia obtida, linha radiolucida no metacarpo, com áreas de reação osteoperiosteal na face dorsal do tálus.

e- Todas as respostas estão corretas.

28- É de conhecimento geral que o posicionamento e as projeções radiográficas adequadas selecionadas para realização de um exame radiográfico são essenciais para o sucesso do radiodiagnóstico. Baseado nessa afirmação pode-se dizer que:

- a- A projeção dorso-lateral-plantar-medial oblíqua, com o paciente em decúbito lateral esquerdo, é ideal para radiodiagnóstico de fratura de C3.
- b- A projeção dorso-medial-plantar-lateral-obliqua-45º, com o paciente em estação, é a ideal para radiodiagnóstico de Síndrome de Wobbler.
- c- A projeção látero-medial, com o paciente em estação, possibilita radiodiagnóstico de luxação C4-C5.
- d- A projeção dorso-palmar oblíqua, com o paciente em estação, possibilita radiodiagnosticar osteíte da 3ª falange.
- e- Todas estão incorretas.

29- Analisando imagens radiográficas arquivadas de equinos, é verdadeiro afirmar que:

- a- Radiodiagnóstico de fratura escapular foi facilmente realizado na projeção dorso- plantar.
- b- Radiodiagnóstico de paciente com osteocondrite do tálus foi baseado na visualização de corpo mineralizado livre intra-articular.
- c- Radiodiagnósticos de osteoartrose foram feitos baseados na visualização de distensão de cápsula articular, aumento de radiopacidade do líquido sinovial e presença de gás intra-articular.
- d- Radiodiagnósticos de genu valgo e genu varo foram realizados na projeção médio- lateral e látero-medial respectivamente.
- e- Todas estão incorretas

30- Na imagem radiográfica anatômica obtida de um equino em crescimento é correto afirmar que:

- a- O atlas se articula com o áxis que se articula com C3; os espaços articulares dessas articulações podem ser visualizados e o processo xifoide se encaixa no atlas que se articula com os côndilos do occipital.
- b- Visualiza-se efeito de subtração pela sobreposição do esôfago sob a escápula.
- c- O osso sesamoide distal também é conhecido por osso navicular ou fabela.
- d- As bolsas guturais são de fácil visualização radiográfica e se apresentam radiolúcidas na imagem.
- e- Todas estão incorretas.



- 31) De acordo com a Constituição Federal (C.F.) de 1988, em relação aos artigos referentes à saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente e unicamente pelo Estado ou, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 - b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e hierarquizada e constituem um sistema único, denominado de Sistema Único de Saúde (SUS).
 - c) A direção centralizada em cada esfera de governo, o atendimento integral e universal com prioridade para serviços assistenciais e a participação da comunidade, são as diretrizes principais do SUS.
 - d) A participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é competência do SUS, mas sim do Ministério do Meio Ambiente.
 - e) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
32. Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, dispostas no artigo 200 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta:
- a) Participar da formulação de políticas de assistência social para reduzir as iniquidades em saúde no país.
 - b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - c) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
 - d) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
 - e) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
33. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais ou privadas, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
 - b) A Vigilância em Saúde do Trabalhador constitui um conjunto de atividades por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores.
 - c) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar.
 - d) A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo unicamente ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, excluindo tal dever das empresas privadas e da sociedade em geral.
 - e) Os níveis de saúde não estão relacionados à organização social do País, porém possuem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o



meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

34. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei Federal nº 8.080 de 1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
- a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
 - b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
 - c) As atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador abrangem participação, no âmbito de competência das empresas privadas em caráter complementar, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - d) A participação da comunidade, assim como o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, constituem alguns dos princípios do SUS.
 - e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
35. Em relação ao controle social definido por meio da Lei Federal nº 8.142/1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:
- a) As conferências, conselhos e plenárias de saúde, são as principais instâncias colegiadas no controle social.
 - b) A Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
 - c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
 - d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo Conselho.
 - e) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
36. De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, Estados e Distrito Federal, deverão contar com todos os itens listados nas alternativas abaixo, exceto:
- a) Fundo de Saúde
 - b) Conselho de Saúde
 - c) Plano de Saúde
 - d) Relatório de Gestão
 - e) Comissão Intergestores de Saúde



37. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), assinale a alternativa incorreta:
- a) A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade do poder público e em caráter complementar pela iniciativa privada.
 - b) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
 - c) A análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde.
 - d) A PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
 - e) A PNVS deverá contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade.
38. De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), as ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde abrangente, são denominadas de :
- a) Vigilância Epidemiológica
 - b) Vigilância em Saúde
 - c) Análise da Situação de Saúde
 - d) Informações Estratégias em Vigilância a Saúde
 - e) Planejamento Estratégico em Saúde
39. Conforme preconizado na Política Nacional de Atenção Básica, todas as alternativas abaixo constituem diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, a serem preconizados na Atenção Básica, exceto:
- a) Territorialização
 - b) Equidade
 - c) Resolutividade
 - d) participação da comunidade
 - e) regionalização
40. O conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos, na Política Nacional de Atenção Básica, é denominado de:
- a) Integralidade
 - b) Territorialização
 - c) Equidade
 - d) Adstrição
 - e) Resolutividade