



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA
Área de Medicina Veterinária Preventiva - Vírus
(Edital n. 02/2024 de 19 de setembro de 2024)

NOME: _____ **CPF** _____

1. As Lentivirose de Pequenos Ruminantes causam um impacto negativo na cadeia produtiva da caprino-ovinocultura, sobre essas enfermidades é correto afirmar que:
 - a) Não são de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal.
 - b) Não são de notificação obrigatória ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
 - c) São consideradas zoonoses ocupacionais.
 - d) Não possuem um Programa de Controle e Erradicação específico e vigente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.
 - e) Nenhuma das anteriores.
2. Sobre o diagnóstico das Lentivirose dos Pequenos Ruminantes é correto afirmar que:
 - a) O isolamento viral é recomendado como teste de triagem em populações livres da infecção.
 - b) A Reação em Cadeia da Polimerase é o principal teste recomendado quando há histórico de vacinação no rebanho.
 - c) A Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) é o teste recomendado para confirmação de casos clínicos.
 - d) A Virusneutralização é o teste com maior sensibilidade para confirmar casos clínicos.
 - e) Nenhuma das anteriores.
3. A Leucose Enzoótica Bovina é uma enfermidade considerada endêmica com registros da infecção em bovinos nas diferentes Unidades Federativas do Brasil. Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
 - a) É ocasionada por um vírus da família *Flaviviridae*
 - b) É ocasionada por um vírus da família *Herpesviridae*
 - c) É ocasionada por um vírus da família *Retroviridae*.
 - d) É ocasionada por um vírus da família *Reoviridae*
 - e) Nenhuma das anteriores.
4. Sobre o diagnóstico da Leucose Enzoótica Bovina é correto afirmar que:
 - a) *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) apresenta alta sensibilidade, sendo o mais recomendado, para confirmação de casos clínicos.
 - b) O diagnóstico clínico-epidemiológico pode ser considerado como definitivo para confirmar a infecção.
 - c) O Leucograma apresenta alta sensibilidade e pode ser utilizado como método confirmatório.
 - d) O isolamento viral é o teste com maior sensibilidade para a realização de estudos de prevalência da infecção.
 - e) Nenhuma das anteriores.
5. A Anemia Infecciosa Equina é uma doença de notificação obrigatória ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
 - a) É ocasionada por um vírus DNA do gênero *Lentivirus*, família *Flaviviridae*.
 - b) É ocasionada por um vírus RNA do gênero *Lentivirus*, espécie *Lentivirus equinifane*.



- c) É ocasionada por um vírus RNA do gênero *Lentivirus*, família *Flaviviridae*.
d) É ocasionada por um vírus RNA do gênero *Lentivirus*, espécie *Lentivirus simimdef*.
e) Nenhuma das anteriores.
6. Sobre o diagnóstico da Anemia Infecciosa Equina é correto afirmar que:
a) *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) direto para pesquisa de antígeno é utilizado como teste confirmatório para trânsito animal.
b) O exame hematológico pode ser utilizado como confirmatório quando há suspeita clínica-epidemiológica.
c) O isolamento viral é utilizado como teste confirmatório para o trânsito animal.
d) Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) é utilizado como teste confirmatório para o trânsito animal.
e) Nenhuma das anteriores.
7. A Diarreia Viral Bovina é uma doença infecto-contagiosa que ocasiona elevadas perdas econômicas devido a problemas reprodutivos, respiratórios e entéricos. Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
a) Possui distribuição mundial e nenhum país até a presente data conseguiu erradicar.
b) Vacas gestantes, se infectadas após os 250 dias, geram bezerros persistentemente infectados.
c) A morbidade da infecção pelo Vírus da Diarreia Viral Bovina é considerada baixa e a mortalidade elevada.
d) A prevalência de animais persistentemente infectados em um rebanho positivo geralmente é inferior a 5%.
e) Nenhuma das anteriores.
8. O diagnóstico da Diarreia Viral Bovina pode ser realizado considerando os achados clínico-epidemiológicos e laboratoriais. Sobre o diagnóstico é correto afirmar que:
a) A confirmação de casos clínicos pode ser realizada com a utilização de *Enzyme-Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) para detecção de antígeno.
b) Os animais persistentemente infectados podem ser identificados com a utilização da Virusneutralização.
c) O isolamento viral pode ser utilizado como um método de triagem para inquéritos epidemiológicos.
d) Imunodifusão em Gel de Ágar é um teste recomendado para o diagnóstico indireto por apresentar elevada especificidade
e) Nenhuma das anteriores.
9. A Rinotraqueíte Infecciosa Bovina é ocasionada por um vírus da família *Orthoherpesviridae*, sobre esta enfermidade é correto afirmar que:
a) Apresenta alta mortalidade e letalidade.
b) Apresenta alta morbidade e letalidade.
c) Apresenta baixa mortalidade e letalidade.
d) Apresenta baixa prevalência e alta incidência.
e) Nenhuma das anteriores.
10. Sobre a etiologia da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, é correto afirmar que:
a) É ocasionada por um vírus RNA e pertence ao gênero *Simplexvirus*.
b) É ocasionada por um vírus DNA e pertence ao gênero *Simplexvirus*.
c) É ocasionada por um vírus RNA e pertence ao gênero *Varicellovirus*.
d) É ocasionada por um vírus DNA e pertence ao gênero *Varicellovirus*.
e) Nenhuma das anteriores.



11. A equideocultura é uma atividade importante do agronegócio no Brasil e movimenta aproximadamente R\$30 bilhões ao ano. Entretanto, algumas doenças infecto-contagiosas podem ocasionar perdas econômicas significativas, dentre essas enfermidades destaca-se a Rinopneumonite Equina, sobre esta enfermidade é correto afirmar que:
- É uma doença com baixa prevalência no mundo e ocorrência somente em países tropicais.
 - A principal forma de transmissão está relacionada com a presença de vetores biológicos no plantel equino.
 - Não existe vacina comercial no Brasil para a prevenção dessa infecção.
 - Equinos infectados conseguem debelar o agente com aproximadamente 1 (um) ano pós-infecção.
 - Nenhuma das anteriores.
12. Sobre o diagnóstico laboratorial da Rinopneumonite Equina é correto afirmar que:
- O diagnóstico histopatológico é considerado como *gold test* para a infecção viral.
 - O diagnóstico pode ser baseado em métodos diretos como a Virusneutralização.
 - A Reação em Cadeia da Polimerase é o método indireto preconizado para detecção do agente.
 - O Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos do Ministério da Agricultura e Pecuária preconiza a Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) como teste confirmatório.
 - Nenhuma das anteriores.
13. A Febre Aftosa é uma doença infecto-contagiosa que acomete animais biungulados e ocasiona queda na produção animal e restrição de comércio internacional. Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
- O Brasil é considerado como um país endêmico e os surtos ocorrem com intervalo de aproximadamente cinco anos.
 - Atualmente o Brasil é considerado livre sem vacinação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).
 - O Brasil possui diferentes estratégias de vacinação e na região nordeste a vacinação ocorre semestralmente.
 - A vacinação é realizada em bovinos de todas as faixas etárias.
 - Nenhuma das anteriores.
14. Sobre os indicadores epidemiológicos da Febre Aftosa é correto afirmar que apresenta:
- Morbidade alta e mortalidade baixa.
 - Morbidade baixa e mortalidade alta.
 - Mortalidade alta e letalidade alta.
 - Morbidade alta e letalidade alta.
 - Nenhuma das anteriores.
15. O Ectima contagioso é uma enfermidade infecto-contagiosa que acomete pequenos ruminantes sendo de notificação obrigatória ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
- Não é considerada como uma zoonose.
 - Faz parte da lista do Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos do MAPA.
 - É considerada como uma doença endêmica em pequenos ruminantes na região Nordeste do Brasil.
 - É uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal.
 - Nenhuma das anteriores.



16. Sobre o diagnóstico do Ectima Contagioso é correto afirmar que:
- a) O diagnóstico sorológico, fixação de complemento, é utilizado como teste de rotina e de triagem para confirmar os casos suspeitos.
 - b) A microscopia eletrônica é utilizada rotineiramente para detectar anticorpos anti-*Poxvirus*.
 - c) A Reação em Cadeia da Polimerase transcriptase reversa é utilizada para detectar o RNA do vírus em amostras biológicas.
 - d) O diagnóstico é realizado com os achados clínicos-epidemiológicos e confirmado laboratorialmente com a técnica de Reação em Cadeia da Polimerase.
 - e) Nenhuma das anteriores.
17. Sobre o diagnóstico virológico é correto afirmar que:
- a) A fixação do complemento é utilizada de forma rotineira para a detecção de antígeno no diagnóstico das Lentivirose dos Pequenos Ruminantes.
 - b) A Imunohistoquímica é um método de diagnóstico que apresenta alta sensibilidade e especificidade na detecção de anticorpos monoclonais.
 - c) A Imunodifusão em Gel de Ágar é utilizada somente para detecção de anticorpos e possui uma sensibilidade baixa e especificidade baixa para o diagnóstico das retrovírus.
 - d) A Reação em Cadeia da Polimerase é utilizada de forma rotineira como método indireto para o diagnóstico das infecções virais.
 - e) Nenhuma das anteriores.
18. Sobre os métodos diretos e indiretos utilizados no diagnóstico de doenças virais é correto afirmar que:
- a) ELISA é utilizado como teste de triagem para diferentes infecções virais, visto que apresenta uma baixa sensibilidade.
 - b) ELISA é utilizado somente para detectar anticorpos circulantes e não pode ser utilizado como um método direto.
 - c) A Reação em Cadeia da Polimerase – Transcriptase Reversa é utilizada para detectar vírus DNA.
 - d) O isolamento viral é considerado como *gold test* no diagnóstico das infecções virais.
 - e) Nenhuma das anteriores.
19. A também chamada de doença vermelha dos suínos, endêmica no Brasil, possui como nomenclatura oficial, qual das opções abaixo?
- a) Peste Suína Africana
 - b) Doença de Aujeszky
 - c) Peste Suína Clássica
 - d) Paralisia Bulbar Infecciosa
 - e) Nenhuma das anteriores.



20. A doença de Aujeszky, também conhecida como “Peste de coçar”, acomete vários órgãos e tecidos de suínos, qual das opções abaixo melhor ilustram os achados clínicos nesses animais?
- Mucosa ocular e nasal
 - Sistema respiratório, nervoso, tegumentar e reprodutivo
 - Sistema urinário, nervoso e ocular
 - Sistema tegumentar, mucosa ocular e nasal
 - Apenas o sistema reprodutivo
21. A raiva é uma doença infecto-contagiosa que acomete animais mamíferos, além de ser considerada uma das principais zoonoses que acomete os seres humanos, devido à sua alta taxa de letalidade. Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
- É uma doença que ocorre frequentemente no Brasil com a circulação de uma única variante do vírus rábico.
 - O vírus da raiva pertence ao gênero *Lyssavirus*, gênero *Rhabdoviridae* e possui vários genótipos.
 - O vírus da raiva é envelopado e não apresenta boa resistência ao meio ambiente.
 - Alternativas a, b e c.
 - Nenhuma das anteriores.
22. Sobre a epidemiologia da raiva, é correto afirmar que:
- Possui distribuição mundial e apresenta alta prevalência nos países europeus.
 - A principal forma de transmissão nos países europeus é através da mordedura de morcegos hematófagos.
 - O principal transmissor da Raiva no Brasil é o morcego hematófago, devido ao sucesso do controle da Raiva em animais de companhia das campanhas de vacinação.
 - O vírus da raiva foi isolado somente em morcegos hematófagos e primatas não humanos.
 - Nenhuma das anteriores.
23. A cinomose canina é uma doença infecciosa que afeta cães, tendo como característica o envolvimento de vários sistemas orgânicos do animal afetado. A respeito de cinomose canina, assinale a afirmativa INCORRETA.
- Devido ao tropismo do agente pelo epitélio vesical, é comum cães doentes apresentarem cálculo renal.
 - Um dos sinais clínicos iniciais da doença é a secreção nasal e ocular, variando de serosa a mucopurulenta, seguida de tosse seca e ocasionalmente tonsilite.
 - Os sinais cutâneos observados são hiperqueratose dos coxins plantares e espelho nasal, além de dermatite pustular na região abdominal ventral.
 - Cães que sobrevivem à infecção branda antes da erupção dos seus dentes permanentes frequentemente apresentam superfícies dentárias irregulares e descoloração marrom, devido à hipoplasia do esmalte.
 - As convulsões podem ser de qualquer tipo, dependendo da região do cérebro afetada e o animal pode desenvolver mioclonia.



24. A cinomose é causada por um paramixovírus e causa sintomatologia multissistêmica. Apresenta intenso contágio entre animais suscetíveis e quadros severos. Sobre esta doença, assinale a alternativa correta:
- a) O vírus da cinomose é envelopado e muito resistente ao meio ambiente.
 - b) O quadro clínico não depende da idade do animal, do estado imunológico e da cepa do vírus.
 - c) Assim como na Raiva, os cães infectados apenas eliminam o vírus pela saliva.
 - d) Possui distribuição mundial, e afeta apenas os cães, sem oferecer riscos a outros canídeos.
 - e) A fonte primária de exposição é o aerossol, e o tratamento baseia-se na terapia de suporte e os animais acometidos apresentam prognóstico reservado.
25. A Imunodeficiência Viral Felina (FIV) ocorre no Brasil de forma endêmica. Sobre essa enfermidade é correto afirmar que:
- a) A principal forma de prevenção é com a utilização de vacinas que são comercializadas no Brasil.
 - b) Apresenta baixa morbidade e mortalidade.
 - c) A transmissão ocorre somente de forma vertical
 - d) É sazonal e ocorre principalmente no inverno e no verão.
 - e) Nenhuma das anteriores.
26. Sobre o diagnóstico da Imunodeficiência Viral Felina (FIV) é correto afirmar que:
- a) Deve ser baseado somente na clínica considerando a especificidade dos sinais clínicos.
 - b) A Reação em Cadeia da Polimerase é utilizada para detectar o DNA proviral.
 - c) O isolamento viral é utilizado na rotina laboratorial por ser um método barato e não precisar de meios de cultivo específicos.
 - d) Pode ser realizado com a utilização de teste imunocromatográfico direto.
 - e) Nenhuma das anteriores.
27. Sobre o Vírus da Leucemia Felina (FeLV) é correto afirmar que:
- a) É um vírus da família *Retroviridae*, subfamília *Oncornavirus*, DNA de fita simples.
 - b) É um retrovírus endógeno patogênico somente para felinos domésticos.
 - c) É altamente resistente no meio ambiente, por possuir envelope, e consegue sobreviver por até 6 (seis) meses em fômites.
 - d) Possui diferentes subgrupos, sendo eles A, B, C e T.
 - e) Nenhuma das anteriores.
28. Sobre o diagnóstico da infecção pelo Vírus da Leucemia Felina é correto afirmar que:
- a) A Reação em Cadeia da Polimerase tem sido utilizada para a detecção do DNA proviral.
 - b) Pode ser realizado exclusivamente utilizando cultivo celular por ser uma técnica de fácil execução com baixa sensibilidade e baixa especificidade.
 - c) Deve ser baseado somente nos achados clínicos-epidemiológicos.
 - d) A Reação em Cadeia da Polimerase é semelhante ao Ensaio Imunoenzimático Indireto na detecção de antígenos.
 - e) Nenhuma das anteriores.



29. Sobre a Peritonite Infecciosa Felina, é correto afirmar que:
- É uma doença bacteriana, sistêmica, imunomediada e geralmente fatal, que acomete felinos selvagens e domésticos.
 - A infecção ocorre através da ingestão ou inalação das partículas sob condições de contato íntimo, especialmente pela via oro-fecal.
 - É uma doença de fácil diagnóstico, visto que há outras enfermidades que apresentam forma clínica semelhante.
 - O diagnóstico é realizado por cultura microbiológica.
 - O paciente apresenta cura total após 5 dias de tratamento.
30. Sobre a peritonite infecciosa felina (PIF) é INCORRETO afirmar:
- O coronavírus é o agente etiológico da peritonite infecciosa felina.
 - A presença do coronavírus felino não confirma o diagnóstico da PIF.
 - O teste de Rivalta é feito com uma gota da efusão em um tubo contendo água destilada e ácido acético, e tem valor preditivo positivo para PIF maior que 80%.
 - Na PIF não efusiva, são frequentes lesões oculares e outras manifestações inespecíficas como febre, redução de apetite e letargia.
 - Nenhuma das anteriores.
- 31) De acordo com a Constituição Federal (C.F.) de 1988, em relação aos artigos referentes à saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente e unicamente pelo Estado ou, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e hierarquizada e constituem um sistema único, denominado de Sistema Único de Saúde (SUS).
 - A direção centralizada em cada esfera de governo, o atendimento integral e universal com prioridade para serviços assistenciais e a participação da comunidade, são as diretrizes principais do SUS.
 - A participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é competência do SUS, mas sim do Ministério do Meio Ambiente.
 - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
32. Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, dispostas no artigo 200 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta:
- Participar da formulação de políticas de assistência social para reduzir as iniquidades em saúde no país.
 - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
 - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
 - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
 - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.



33. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais ou privadas, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
 - b) A Vigilância em Saúde do Trabalhador constitui um conjunto de atividades por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores.
 - c) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar.
 - d) A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo unicamente ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, excluindo tal dever das empresas privadas e da sociedade em geral.
 - e) Os níveis de saúde não estão relacionados à organização social do País, porém possuem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
34. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei Federal nº 8.080 de 1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
- a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
 - b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
 - c) As atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador abrangem participação, no âmbito de competência das empresas privadas em caráter complementar, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - d) A participação da comunidade, assim como o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, constituem alguns dos princípios do SUS.
 - e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
35. Em relação ao controle social definido por meio da Lei Federal nº 8.142/1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:
- a) As conferências, conselhos e plenárias de saúde, são as principais instâncias colegiadas no controle social.
 - b) A Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
 - c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
 - d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo Conselho.
 - e) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.



36. De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, Estados e Distrito Federal, deverão contar com todos os itens listados nas alternativas abaixo, exceto:
- a) Fundo de Saúde
 - b) Conselho de Saúde
 - c) Plano de Saúde
 - d) Relatório de Gestão
 - e) Comissão Intergestores de Saúde
37. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), assinale a alternativa incorreta:
- a) A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade do poder público e em caráter complementar pela iniciativa privada.
 - b) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
 - c) A análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde.
 - d) A PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
 - e) A PNVS deverá contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade.
38. De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), as ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde abrangente, são denominadas de :
- a) Vigilância Epidemiológica
 - b) Vigilância em Saúde
 - c) Análise da Situação de Saúde
 - d) Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde
 - e) Planejamento Estratégico em Saúde
39. Conforme preconizado na Política Nacional de Atenção Básica, todas as alternativas abaixo constituem diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, a serem preconizados na Atenção Básica, exceto:
- a) Territorialização
 - b) Equidade
 - c) Resolutividade
 - d) participação da comunidade
 - e) regionalização



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



40. O conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos, na Política Nacional de Atenção Básica, é denominado de:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) Integralidade | d) Adstrição |
| b) Territorialização | e) Resolutividade |
| c) Equidade | |

